

WELCOME.



Вода

Источник: MS Schippers.



Вода

Вода чрезвычайно важна, как количество, так и качество.


Всегда рекомендуется подкислять и очищать воду.

Биопленка в водопроводных трубах снижает действие водных лекарств..

Всегда добавлять кислоты, pH должен быть между 3,8 и 4.

pH ниже 4 остановит рост бактерий в кишечнике свиньи.

Оценка кондиции (BCS)



Body Score	1	2	3	4	5
Backfat, in.	<0.6	0.60 - 0.70	0.70 - 0.80	0.80 - 0.90	>0.90
Backfat, mm	<15	15 - 18	18 - 20	20 - 23	>23

Score	Condition	Body Shape
1	Emaciated hip	Backbone prominent to the eye
2	Thin hips	Backbone easily felt without applying palm pressure
3	Ideal hips	Backbone felt only with firm palm pressure
4	Fat hips	Backbone cannot be felt
5	Over fat hips	Backbone heavily covered

Жирные/ худые свиноматки.

Жирные.

- Проблемные опоросы, больше мертворожденных поросят.
- Снижение потребления кормов в период лактации приводит к уменьшению выработки молока.
- Дорогие корма.

Худые.

- Дефицит энергии, проблемные опоросы.
- Снижение потребления кормов в период лактации приводит к уменьшению выработки молока.
- В последствии слабая половая охота.

Идеальная кондиция.

Опорос

- Опорос, цель 3 - 3.5.

Отъем

- Отъем, желаемый показатель 2.5 – 3.

Осеменение - освещение.

- Дни становятся короче, поэтому в это время года очень важен свет.
- минимум 300 LUX на голову свиноматки.
- Мы должны обмануть гормональная система свиноматки, чтобы заставить ее думать, что пришло время для супоросности.
- Свет должен быть в течение 16 часов в сутки.

Осеменение - освещение.



Осеменение - освещение



Гестация – освещение.

- Гестация, 100-200 LUX.

При недостатке освещения в ранние сроки супоросности свиноматки выделяют мелатонин, который снижает уровень гормона прогестерон, что может привести к потере плода.

- Свет должен быть в течение 16 часов в сутки.

Гестация – освещение.



Гестация – освещение.



Опорос - кормление.

- Кормление минимум 3 раза в день.
- При **каждом** кормлении ВСЕ свиноматки должны вставать, чтобы стимулировать прием корма и воды. Свиноматок в опоросе можно исключить.
- Необходимо регулировать и увеличивать количество кормов. первую неделю увеличивайте количество на 0,5 кг в день, через 1 неделю - на 0,25 кг, пока свиноматка съедает весь корм. Макс. 10 кг.
- Регулировку количества кормов нужно проводить через полчаса после одного и того же кормления каждый день.
- Перед каждым кормлением остатки кормов нужно убрать, корм должен быть всегда свежим.

Опорос - кормление.



Опорос - кормление.

Кривая кормления для свиноматок

Цель - высокое потребление кормов,

день 0 = день опороса

-2 - 3.5

-1 - 3.5

0 - 3.5

1 - 4.0

2 - 4.5

3 - 5.0

4 - 5.5

5 - 6.0

6 - 6.5

7 - 7.0

8 - 7.25

14 - 8.75

16 - 9.25

17 - 9.5

21 - 10.0

Когда кривая кормления достигает максимума, правило: 3 кг для свиноматки и 0,5 кг на поросят, что соответствует 9,5 кг на свиноматку в день при 13 поросятах. Для свиноматок с 11 поросятами максимальное количество корма составляет 8,5 кг на свиноматку в день.

Поросята.

Молозиво – важный фактор для здоровья поросенка.

При большом помете разделить его, чтобы каждый поросенок получил молозиво.

Можно давать ЗЦМ в течение 1-7 дней.

Высококачественный престартер с 4-5 дня.

Престартер нужно скармливать 2-3 раза в день.

Обеспечьте доступ к свежей воде.


Следите за тем, чтобы место содержания всегда было чистым, сухим и теплым.

Всегда нужен внешний источник тепла.

Разделение помета, чтобы каждый получил молоко.



Свиноматки-кормилицы.



Опорос.



Опорос.



Поросята - доращивание

Всегда чисто, сухо
и тепло.

Разделить поросят
по размеру, так их
проще корректно
кормить.

Обеспечьте
дополнительную
площадь для
кормления в первую
неделю.

В первую неделю
предлагайте
дополнительно
воду.

Корм хорошего
качества, особенно
первые 2 недели.

Хорошее и
достаточное
обеспечение
водой.

Именно в группе
доращивания вы
получите наибольшую
пользу от
использования кислот
в воде.

Дополнительная кормушка.



Дополнительная кормушка.



Откорм.

Чисто, сухо и тепло.

Достаточное водоснабжение, также при использовании систем влажной подачи.

Сортировка животных для продажи.

Хорошее правило 20-20-60.

Когда самые крупные животные достигнут продажного веса, продайте 20% свиней в загоне.

На следующей неделе продайте еще 20%.

Третья неделя, опустошите загон, продайте оставшиеся 60%

Делай правильно.

- Рутина.
- Точность.
- Стандартные процедуры.
- Дисциплина.
- Корм, вода и места содержания.
- **СОТРУДНИКИ. Тренинги, обучение, вовлечение, мотивация, вознаграждение.**
- **Без своих людей вы не сможете добиться нужного результата.**

Спасибо за внимание.